# Комплексная схема защиты Зерновых культур

| | | 12 | 13 | 21 | 25 | 29 | 30 | 31 | 32 | 37 | 51-59 | 61-69 | 85-86 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | До посева | 2-й лист | 3-й лист | начало кущения | середина кущения | конец кущения | Выход в трубку | 1-е междоузлие | 2-е междоузлие | Флаговый лист | Колошение | Цветение | Восковая спелость | Полная спелость | **Хранение** |
| Гельминтоспориозная корневая гниль, мучнистая роса (на слабом инфекционном фоне, плесневение семян, пыльная головня, снежная плесень, твердая головня, фузариозная корневая гниль | **БАЛИНТ КС** 1-1,2 л/т<br>**ВИНЦЕНТ КС** 1,5-2,0 л/т<br>**РАНАЗОЛ УЛЬТРА** 0,2-0,25 л/т | | | | | | | | | | | | | | |
| Внутристеблевая муха, хлебная блошка | **КОНРАД КС** 0,3-0,6 л/т | | | | | | | | | | | | | | |
| Однолетние однодольные и двудольные сорняки | **АРГУМЕНТ ВР** 3,0-4,0 л/га<br>**АРГУМЕНТ СТАР ВР** 1,4-2,5 л/га | | | | | | | | | | | | | | |
| Многолетние однодольные и двудольные сорняки | **АРГУМЕНТ ВР** 4,0-6,0 л/га<br>**АРГУМЕНТ СТАР ВР** 2,4-4,0 л/га | | | | | | | | | | | | | | |
| Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки, включая виды осота (бодяк и др.) | **ГЕРБ-480 ВР** 0,15-0,5 л/га | | | **ГЕРБ-480 ВР** 0,15-0,5 л/га | | | | | | | | | | | |
| Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | **ДИКАМИН-Д** ВР 1,0-1,6 л/га | | | **ДИКАМИН-Д ВР** 1,0-1,6 л/га | | | | | | | | | | | |
| Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки. | | | | **СИЛАРД ВДГ** 0,08-0,12 кг/га<br>**ЛОННЕР ЕВРО ВР** 0,16-0,5 л/га | | | | | | | | | | | |
| Однолетние злаковые сорняки (овсюг, метлица щетинники, просовидные) | | | | **ПОЛГАР КЭ** 0,6-0,74 л/га | | | | | | | | | | | |
| | | | **ПОЛГАР 7,5 ВР** 0,8-1,0 л/га | | | | | | | | | | | | |
| Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х | | | **ХИМСТАР ВДГ 0**,015-0,025 кг/га + **ЭТД90 0,2 л/га** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **МАУЗЕР СП 0,008-0,010 кг/га** + **ЭТД90 0,2 л/га**<br>Соблюдать ограничения по севообороту! При необходимости пересева обработанной площади высевать только зерновые культуры. На следующий год после уборки нельзя высевать свеклу и овощи. Гречиху и подсолнечник только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки. | | | **ЛЮГЕР СЭ** 0,35-0,6 л/га<br>**ЭЛАНТ КЭ** 0,6-1,0 л/га | | | | | | | | | | | |
| Внутристеблевая муха, клоп вредная черепашка, пьявица, тля, трипс, блошки, цикадки, хлебная жужелица, хлебный жук | | **АРМИН КЭ** 0,1 л/га<br>**ТИБОР КЭ** 0,15-0,25 л/га<br>**ГЕДЕОН КЭ** 0,2 л/га<br>**ТЕРРАДИМ КЭ** 1,0-1,5 л/га<br>**КОНФИБОЙ ВРК** 0,1-0,25 л/га | | | | | | | | | | | | |
| Мучнистая роса, пиренофороз, ржавчина бурая, ржавчина желтая, ржавчина стеблевая, септориоз колоса, септориоз листьев. | | **ЗОЛТАН КЭ** 0,4-0,5 л/га<br>**ФОРИС КС** 0,5 л/га<br>**ПЕОН КЭ 0,5 л/га** | | | | | | | | | | | | |
| Корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания, мучнистая роса. Церкоспорелез, гельминтоспориоз. | | **НОР-БИ СП** 0,3-0,6 кг/га<br>**КАЗИМ КС 0,3-0,6 л/га** | | | | | | | | | | | | |
| Десикация | | | | | | | | | | | | | АРГУМЕНТ* ВР 3,0-4,0 л/га<br>АРГУМЕНТ СТАР* ВР 1,4-2,5 л/га | |
| Насекомые вредители запасов | | | | | | | | | | | | | | ФУМИФОС 6-9 г/м3 (2-3 таблетки) |

* На заключительной стадии расширения регистрации для применения на данной культуре.