

Комплексная схема защиты Льна

		00	06-07	09-24	28-40	42-62	68-75
	Семена	Посев	Всходы	Фаза «ёлочки»	Бутизация	Цветение	Созревание
Комплекс болезней	ВИНЦЕНТ* КС 1,5-2, л/т						
Льняные блошки: синяя коричневая и др.	Конрад* КС 0,8-1,0 л/т						
Однолетние злаковые и двудольные сорняки		Аргумент ВР 3,0-4,0 л/га Аргумент Стар ВР 1,4-2,5 л/га					
Многолетние злаковые и двудольные сорняки		Аргумент ВР 4,0-6,0 л/га Аргумент Стар ВР 2,4-4,0 л/га					
Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА и некоторые многолетние сорняки				МАУЗЕР* СП 0,008-0,010 кг/га + ЭТД90/ДАР90 0,2 л/га Соблюдать ограничения по севообороту! При необходимости пересева обработанной площади высевать только зерновые культуры. На следующий год после уборки нельзя высевать свеклу и овощи. Гречиху и подсолнечник только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху если pH почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур.			
Однолетние злаковые сорняки				Галант-104* , КЭ 0,5 л/га			
Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)				Галант-104* , КЭ 1,0 л/га			
Виды осота, горца, бодяка, ромашки, латука.				Силард ВДГ 0,09 кг/га			
Льняная блоха, льняной долгоносик, льняной трипс, долгоножка вредная, совка-гамма, луговой мотылек,				Тибор* КЭ 0,3-0,4 л/га Армин* КЭ 0,1 л/га Геденон* КЭ 0,1-0,2 л/га ТЕРРАДИМ КЭ 0,5-1,0 л/га			
Десикация (за 7-8 дней до уборки) в фазе «ранней желтой спелости» у льна-долгунца. В фазу «желтой спелости» на льне масличном							Донат* ВР 1,5-2,0 л/га

* На заключительной стадии расширения регистрации для применения на данной культуре.